





Durante i periodi di carestia, le madri molto affamate possono arrivare anche addirittura a divorare i loro piccoli. Le femmine raggiungono la maturità sessuale a circa

1 anno d'età. Hanno un periodo estrale di circa 3 settimane che va da fine ottobre a fine gennaio e rimangono in calore per 3 giorni.

Dura circa 114 giorni, quale si allontana dal luogo tranquillo e sicuro adeguato giaciglio in folto della vegetazione.



La gravidanza al termine della gravidanza, cerca un ro e prepara una tana nel

Il numero dei cuccioli può cambiare a seconda del peso e dell'età della madre. Di solito si va da un minimo di 2-3 cuccioli fino ad un massimo di 7-8. Il pelo dei cuccioli è striato perché così si mimetizzano meglio tra la vegetazione.



Le mosche sono concentrate tra marzo e giugno. I cuccioli sono allattati per 3-4 mesi nella tana. Già dalla seconda settimana di vita, cominciano a lasciare la tana per brevi periodi seguendo la madre alla



ricerca di cibo. All'età di 3-4 mesi i piccoli sono svezzati. Le femmine si riuniscono con i loro piccoli che verso i 7 mesi diventano indipendenti proprio poco prima della prossima eventuale accudata della madre. Le femmine del cinghiale vivono in branchi anche molto numerosi. I branchi sono formati da diverse unità familiari in parentate tra loro e i piccoli vengono allevati e difesi da tutte le scrofe.

